

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

Важно регулярно контролировать все Ваши симптомы. Это документ для быстрого напоминания.

ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМАХ:

- продолжительная боль в груди, которая не проходит после применения нитроглицерина;
- тяжелая и продолжительная одышка;
- обморок.

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ВАШЕГО ВРАЧА ИЛИ МЕДСЕСТРУ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМАХ:

- усиление одышки и ухудшение переносимости физической нагрузки;
- одышка, заставляющая просыпаться;
- необходимость дополнительных подушек для комфортного сна;
- частое сердцебиение или ухудшение пульсации сердца.

ОБСУДИТЕ С ВАШИМ ВРАЧОМ ИЛИ МЕДСЕСТРОЙ:

- быструю прибавку в весе (более 2 кг за 3 дня);
- нарастающий отек или боль в животе;
- нарастание отеков голеней и лодыжек;
- усиление головокружения;
- потерю аппетита/тошноту;
- нарастающее утомление;
- усиливающийся кашель.

Если у вас есть какие-либо другие симптомы, которые вас волнуют, обсудите их с вашим.

В случае чрезвычайной ситуации позвоните: (ввести имя Вашего врача или медсестры)	
---	--



ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

Тел.:	
-------	--